

Le vaccin contre l'herpès zoster : guide de poche du vaccinateur

Le vaccin contre l'herpès zoster – Usage recommandé

Le Comité consultatif national de l'immunisation¹ recommande le vaccin contre l'herpès zoster :

- aux personnes de 60 ans et plus pour lesquelles il n'existe aucune contre-indication
- peu importe si ces personnes ont déjà eu la varicelle ou une infection attestée au virus de la varicelle
- le vaccin peut être indiqué pour les personnes de 50 à 60 ans; ces personnes devraient demander à leur médecin de leur expliquer les avantages et les inconvénients du vaccin.

Dose

La posologie du vaccin contre l'herpès zoster est d'une seule dose de 0,65 mL, administrée en injection sous-cutanée dans le muscle deltoïde (haut du bras).

Précautions et contre-indications

NE PAS administrer le vaccin contre l'herpès zoster :

- aux adultes ayant une hypersensibilité anaphylactique à un composant du vaccin
- aux adultes présentant une immunodéficience congénitale ou acquise
- aux adultes prenant des médicaments immunodépresseurs
- aux femmes enceintes ou aux personnes de moins de 50 ans
- aux adultes ayant une tuberculose active non traitée
- il est préférable de reporter la vaccination en cas de maladie aiguë (fièvre, p. ex.)

Réactions indésirables possibles

- érythème
- douleur ou sensibilité au toucher
- enflure et éruption cutanée au lieu d'injection

Administration simultanée d'autres vaccins

- Le vaccin antigrippal trivalent peut être administré en même temps que le vaccin contre l'herpès zoster, mais sur un lieu d'injection différent
- Le vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque et le vaccin contre l'herpès zoster doivent être administrés à au moins 4 semaines d'intervalle.

Références

¹ Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), « Déclaration sur l'utilisation recommandée du vaccin contre le virus de l'herpès zoster », RMTc, vol. 36, DCC-1 (janvier 2010).

Sur Internet : <http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/10vol36/acs-1/index-fra.php>

Pour en savoir plus

Coalition canadienne pour la sensibilisation et la promotion de la vaccination (CCSPV)

Tél. : 613.725.3769 x 122

Courriel : immunize@cpha.ca

Site Web : immunize.ca

août 2010



Coalition canadienne
pour la sensibilisation et
la promotion de la vaccination
immunize.ca



English version on reverse side.